

INFORMAÇÕES**Qual é raça PREDOMINANTE dos animais?**

- ☐ Girolando
☐ Holandês
☐ Jersolando
☐ Jersey
☐ Pardo suíço
☐ Gir
☐ Outras

Qual é a ÁREA PRODUTIVA, PARA O LEITE, em hectares? (instalações, área agrícola, pastagens) _____**Qual é a atual quantidade de VACAS EM LACTAÇÃO?** _____**Qual é MÉDIA DE PRODUÇÃO DIÁRIA (kg/vaca/dia)?** _____**Qual(is) instalação(ões) existe(m) para as VACAS EM LACTAÇÃO?** (Marque quantas opções desejar.)

- ☐ Não tenho a informação
☐ Compost Barn
☐ Free-stall
☐ Cross ventilation
☐ Piquete de terra batida ou Piquetão
☐ Pista de alimentação coberta para vacas em pastejo
☐ Pista de alimentação sem cobertura para vacas em pastejo
☐ Pastejo rotacionado
☐ Outro(s)

Qual o NÚMERO DE ORDENHAS realizadas por dia?

- ☐ 1 ordenha
☐ 2 ordenhas
☐ 3 ordenhas
☐ Ordenhas por robô
☐ Não tenho a informação

Qual(is) instalação(ões) ou manejo(s) existe(m) para as BEZERRAS MAMANDO? (Marque quantas opções desejar.)

- ☐ Casinhas
☐ Tropical ou argentino
☐ Gaiolas suspensas individuais
☐ Gaiolas suspensas em dupla
☐ Coletivo com aleitamento manual
☐ Coletivo com alimentador automático
☐ Aleitamento natural

Qual(is) o(s) MANEJO(S) REPRODUTIVO(S) realizado(s) na propriedade? (Marque quantas opções desejar.)

- ☐ Não tenho a informação
☐ Monta natural
☐ Monta controlada
☐ Inseminação simples
☐ Inseminação artificial a tempo Fixo (IATF)
☐ Transferência de embriões e/ou Fertilização in vitro (FIV)

A fazenda participa de algum programa de PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS?

- (Exemplos: Boas Práticas Agropecuárias, Programas governamentais como SENAR, SEBRAE, Prefeitura etc.).
☐ Não tenho a informação
☐ Não
☐ Sim

Quantas PESSOAS trabalham na atividade leiteira? (inclusive proprietários(as) atuantes) _____**O LEITE é a atividade PRINCIPAL da fazenda?**

- ☐ Não
☐ Sim - propriedade familiar
☐ Sim - proprietário(s) presente(s)

Qual é a sua PRINCIPAL ATUAÇÃO na fazenda?

- ☐ Proprietário (a)
☐ Técnico(a)/Consultor(a)
☐ Gestor(a)
☐ Colaborador(a)
☐ Outros

NUTRIÇÃO**Os cochos de alimentação têm ESPAÇO para TODOS os animais comerem ao MESMO TEMPO?**

- ☐ Raramente ou nunca
☐ Às vezes
☐ Frequentemente
☐ Sempre

A quantidade de alimento fornecida leva em consideração a avaliação de SOBRA DE ALIMENTOS NOS COCHOS?

- ☐ Raramente ou nunca
☐ Às vezes
☐ Frequentemente
☐ Sempre

Há presença de ALIMENTOS DETERIORADOS ou MOFADOS na dieta dos animais?

- ☐ Sempre
☐ Frequentemente
☐ Às vezes
☐ Raramente ou nunca

Os BEBEDOUROS estão LIMPOS?

- ☐ Raramente ou nunca
☐ Às vezes
☐ Frequentemente
☐ Sempre

Os BEBEDOUROS estão CHEIOS?

- ☐ Raramente ou nunca
☐ Às vezes
☐ Frequentemente
☐ Sempre

Qual é o escore de condição corporal médio das VACAS no momento da SECAGEM?

- ☐ Menos de 3,0 para animais europeus, menos de 3,5 para mestiços e zebuínos
☐ Entre 3,0 e 3,5 para animais europeus, entre 3,5 e 3,75 para mestiços e zebuínos

- ☐ Mais de 3,5 para animais europeus, mais de 3,75 para mestiços e zebuínos

Qual é o escore de condição corporal médio das vacas ao PICO DE LACTAÇÃO?

- ☐ Menos de 2,75 para animais europeus, menos de 3,0 para mestiços e zebuínos
☐ Entre 2,75 e 3,25 para animais europeus, entre 3,0 e 3,5 p/ mestiços e zebuínos
☐ Mais de 3,25 para animais europeus, mais de 3,5 para mestiços e zebuínos

Quantas vezes por dia os bezerros recebem LEITE ou SUCEDÂNEO de leite? (na maior parte dos dias em aleitamento)

- ☐ 1 vez por dia
☐ 2 vezes por dia
☐ 3 ou mais vezes por dia
☐ Aleitamento natural (ao pé da vaca)

Quantos LITROS DE LEITE os bezerros recebem POR DIA? (média de todo o período de aleitamento)

- ☐ 4 litros ou menos por dia
☐ 5 a 6 litros por dia
☐ Mais de 6 litros por dia
☐ Aleitamento natural (ao pé da vaca)

Os bezerros começam a receber CONCENTRADO já na PRIMEIRA SEMANA de vida?

- ☐ Raramente ou nunca
☐ Às vezes ou para alguns animais
☐ Frequentemente ou para a maioria dos animais
☐ Sempre para todos os animais

Os bezerros começam a receber ÁGUA à vontade já no PRIMEIRO DIA de vida?

- ☐ Raramente ou nunca
☐ Às vezes ou para alguns animais
☐ Frequentemente ou para a maioria dos animais
☐ Sempre para todos os animais

Qual a forma de DESALEITAMENTO predominante na fazenda?

- ☐ Abrupto
☐ Gradual por quantidade fixa (ex.: redução de 2 litros por vez)
☐ Gradual por avaliação do consumo de concentrado (mínimo 1kg/animal/dia)

É utilizado LEITE DE DESCARTE na alimentação dos bezerros?

- ☐ Sim, para todos os animais, sem pasteurizar
☐ Sim, para todos os animais, pasteurizado
☐ Apenas para parte das bezerras, sem pasteurizar
☐ Apenas para parte das bezerras, pasteurizado
☐ Apenas para parte dos bezerros, pasteurizado
☐ Apenas para parte dos bezerros, sem pasteurizar
☐ Nunca

AMBIENTE (INSTALAÇÕES)

Os LOCAIS onde os animais permanecem a maior parte do tempo estão LIMPOS? (sem acúmulo de dejetos, barro etc.)

- ☐ Raramente ou nunca
☐ Às vezes
☐ Frequentemente
☐ Sempre

Há SOMBRA suficiente para todos os animais?

- ☐ Raramente ou nunca
☐ Às vezes
☐ Frequentemente
☐ Sempre

Alguma categoria de animais demonstra SINAIS de que estão com MUITO CALOR? (por exemplo: respiração ofegante)

- ☐ Sempre
☐ Frequentemente
☐ Às vezes
☐ Raramente ou nunca

As FIAÇÕES das instalações são ATERRADAS para evitar CHOQUES E DESCARGAS ELÉTRICAS? (inclusive cercas elétricas, se for o caso)

- ☐ Raramente ou nunca
☐ Às vezes
☐ Frequentemente
☐ Sempre

Qual é o ESCORE DE LIMPEZA das BEZERRAS e novilhas?

- ☐ 4 - Muito sujas
☐ 3 - Sujas
☐ 2 - Razoavelmente limpas
☐ 1 - Limpas

Qual é o ESCORE DE LIMPEZA das VACAS?

- ☐ 4 - Muito sujas
☐ 3 - Sujas
☐ 2 - Razoavelmente limpas
☐ 1 - Limpas

Há acúmulo de água, dejetos ou lama no piso da sala de ordenha e da sala de espera?

- ☐ Sempre
☐ Frequentemente
☐ Às vezes
☐ Raramente ou nunca

O EQUIPAMENTO DE ORDENHA está REGULADO, respeitando os parâmetros de vácuo e pulsação recomendados pelo fabricante?

- ☐ Raramente ou nunca
☐ Às vezes
☐ Frequentemente
☐ Sempre

Há sinais de DESCONFORTO na ORDENHA? (como, por exemplo, coices, ausência de ruminação)

- ☐ Sempre
☐ Frequentemente
☐ Às vezes
☐ Raramente ou nunca

O piso da SALA DE ORDENHA é de qual material?

- ☐ Pedra ou cascalho
☐ Terra
☐ Concreto
☐ Borracha

O piso da SALA DE ESPERA é de qual material?

- ☐ Pedra ou cascalho
☐ Terra
☐ Concreto
☐ Borracha

Há sinais de que os ANIMAIS SE MACHUCAM nas estruturas dos galpões, cochos, ordenha etc.?

- ☐ Em todos os animais
☐ Na maioria dos animais
☐ Em poucos animais
☐ Em nenhum animal

Em relação à cama ou à área p/ as VACAS em lactação se DEITAREM, considerando o sistema predominante, qual opção melhor representa a realidade?

- ☐ Não sei precisar (a falta da informação impacta no score)
☐ Free-stall – NÃO permite a maioria das vacas se deite simultaneamente (< 85%)
☐ Free-stall – grande parte das vacas pode se deitar ao mesmo tempo (85% ou mais)
☐ Compost barn – maioria NÃO se deita simultaneamente (< 10 m²/ vaca no galpão)
☐ Compost barn – maioria se deita simultaneamente (> 10 m²/ vaca no galpão)
☐ Piquete ou Pista – SEM acesso à área de descanso
☐ Piquete ou Pista – COM acesso à área de descanso

Para vacas secas, novilhas e fêmeas na recria, há LOCAL ADEQUADO e ESPAÇO SUFICIENTE para que se DEITEM e DESCANSEM sempre que quiserem?

- ☐ Raramente ou nunca
☐ Às vezes
☐ Frequentemente
☐ Sempre

SANIDADE

O rebanho é avaliado/acompanhado presencialmente por MÉDICO(A) VETERINÁRIO(A)?

- ☐ Não houve visitas presenciais nos últimos 12 meses
☐ Uma vez por ano
☐ 2 a 4 vezes por ano
☐ A cada 2 meses
☐ Mensalmente ou mais frequentemente

A fazenda possui CALENDÁRIO SANITÁRIO orientado por Médico(a) Veterinário(a)?

- ☐ Não
☐ Para algumas enfermidades
☐ Para algumas categorias de animais

☐ Sim, para todas as enfermidades e todas as categorias de animais

Todos os ANIMAIS DOENTES recebem CUIDADOS e terapia de SUPORTE, sendo os tratamentos predominantemente ORIENTADOS POR VETERINÁRIOS(AS)?

- ☐ Raramente ou nunca
☐ Às vezes
☐ Frequentemente
☐ Sempre

Qual é a CCS (contagem de células somáticas) média do rebanho? (Média dos últimos 2 ou 3 meses.)

- ☐ Maior que 900 mil/ml
☐ 500 a 900 mil/ml
☐ 300 a 500 mil/ml
☐ menor que 300 mil/ml

Há a preocupação com o USO RACIONAL DE ANTIBIÓTICOS no tratamento de MASTITE? Selecione a opção predominante.

- ☐ Não tenho a informação
☐ Não há a preocupação
☐ Sim, há o uso cuidadoso porém SEM CULTURA - foco na bula.
☐ Sim, com CULTURA EXTERNA e adoção PARCIAL das recomendações
☐ Sim, com CULTURA EXTERNA e adoção TOTAL das recomendações
☐ Sim, com CULTURA NA FAZENDA e adoção PARCIAL das recomendações
☐ Sim, com CULTURA NA FAZENDA e adoção TOTAL das recomendações

Você considera que os cuidados com a HIGIENIZAÇÃO DOS MATERIAIS, como agulhas, são observados no momento da aplicação de produtos injetáveis?

- ☐ Não tenho a informação
☐ Raramente ou nunca
☐ Às vezes
☐ Frequentemente
☐ Sempre

As BEZERRAS recém-nascidas recebem COLOSTRO EM ATÉ 2 H de vida e em quantidade igual ou maior que 10% do seu peso?

- ☐ Não sei (a falta da informação impacta no score)
☐ Raramente ou nunca
☐ Às vezes
☐ Frequentemente
☐ Sempre

A MOCHAÇÃO é realizada com uso de ANALGESIA? (não considerar anestésicos, apenas o uso de analgésicos, como anti-inflamatórios por exemplo)

- ☐ Raramente ou nunca
☐ Às vezes
☐ Frequentemente
☐ Sempre
☐ Não realizamos descorna

A MOCHAÇÃO é realizada antes dos 30 dias de idade?

- ☐ Raramente ou nunca
☐ Às vezes
☐ Frequentemente
☐ Sempre
☐ Não realizamos descorna

Todos os PROCEDIMENTOS DOLOROSOS são realizados com uso de ANESTÉSICOS? (mochação, castração e cirurgias em geral)

- ☐ Raramente ou nunca
☐ Às vezes
☐ Frequentemente
☐ Sempre

São adotados PROTOCOLOS para o tratamento de TRISTEZA PARASITÁRIA?

- ☐ Não são adotados
☐ São adotados e o tratamento é feito SEM a identificação do agente causador
☐ São adotados c/ tratamento específico, pela identificação do agente (esfregaço)
☐ Não são adotados por não ser necessário na região da fazenda

Qual a TAXA DE MORTALIDADE das BEZERRAS do nascimento ATÉ 1 ANO de vida?

- ☐ Não sei precisar (a falta da informação impacta no score)
☐ Maior que 12%
☐ Entre 10 e 12%
☐ Entre 7 e 9%
☐ Menor ou igual a 6%

Qual cenário descreve melhor a situação da fazenda em relação à prevenção contra Brucelose e Tuberculose?

- ☐ Não há controle
☐ Vacinação contra brucelose
☐ Vacinação e exames pontuais (transporte, etc.)
☐ Vacinação e exames anuais
☐ Propriedade certificada como livre das doenças

COMPORTAMENTO**As BEZERRAS conseguem VER umas às OUTRAS entre o nascimento e a desmama?**

- ☐ Raramente ou nunca
☐ Às vezes
☐ Frequentemente
☐ Sempre
☐ Não se aplica ao sistema de criação da fazenda

APÓS O DESALEITAMENTO, o sistema de criação de bezerras permite INTERAÇÃO ENTRE ELAS?

- ☐ Raramente ou nunca
☐ Às vezes
☐ Frequentemente
☐ Sempre
☐ Não se aplica ao sistema de criação da fazenda

Existem animais que ficam AMARRADOS por cordas ou correntes? (Exceto bezerros mamando.)

- ☐ Sempre
☐ Frequentemente
☐ Às vezes
☐ Raramente ou nunca

Os animais CONFINADOS conseguem se MOVIMENTAR com alguma liberdade?

- ☐ Raramente ou nunca
☐ Às vezes
☐ Frequentemente
☐ Sempre
☐ Não se aplica ao sistema de criação da fazenda

Há objetos lúdicos disponíveis para BEZERRAS E NOVILHAS? (Marque todas as opções aplicáveis.)

- ☐ Nenhum
☐ Coçador ou escova
☐ Bola ou pneu
☐ Brinquedos criativos (garrafa pet, etc)
☐ Outro(s) e/ou Pastagens

Há objetos lúdicos disponíveis para VACAS? (Marque todas as opções aplicáveis.)

- ☐ Nenhum
☐ Coçador ou escova
☐ Bola ou pneu
☐ Brinquedos criativos (garrafa pet, etc)
☐ Outro(s) e/ou Pastagens

Há área EXCLUSIVA, ISOLADA dos demais animais e de fluxo de pessoas e máquinas, p/ a VACA PARIR c/ tranquilidade e a bezerra permanecer c/ a vaca nos primeiros momentos após o parto? (exemplo: pasto maternidade)

- ☐ Raramente ou nunca
☐ Às vezes
☐ Frequentemente
☐ Sempre

Há INTERAÇÕES AGRESSIVAS entre os animais durante a alimentação ou descanso?

- ☐ Sempre
☐ Frequentemente
☐ Às vezes
☐ Raramente ou nunca

ESTADO MENTAL**Os animais se APROXIMAM DOS COLABORADORES da fazenda?**

- ☐ Raramente ou nunca
☐ Às vezes
☐ Frequentemente
☐ Sempre

Os animais caminham devagar, sem pressa, durante as movimentações coordenadas pela equipe da fazenda?

- ☐ Raramente ou nunca
☐ Às vezes
☐ Frequentemente
☐ Sempre

Há uso de varas, paus ou outros instrumentos para cutucar, controlar ou conter os animais?

- ☐ Sempre
☐ Frequentemente
☐ Às vezes
☐ Raramente ou nunca

Ocorrem situações que causem MEDO ou PÂNICO nos animais? (Gritos, movimentos bruscos, torcer rabo, bater nos animais.)

- ☐ Sempre
☐ Frequentemente
☐ Às vezes
☐ Raramente ou nunca

Os bezerros MACHOS permanecem por dois dias ou menos no rebanho, ou seja, são retirados rapidamente da propriedade?

- ☐ SIM, saem rapidamente e o destino não é controlado
☐ SIM e procuramos enviar para criadores que adotam boas práticas de recria
☐ NÃO SAEM, ficam algum tempo na fazenda, SEM cuidados similares aos das bezerras
☐ NÃO SAEM, ficam algum tempo na fazenda, COM cuidados similares aos das bezerras

Quais os cuidados fornecidos para os BEZERROS MACHOS? Marque todas as opções aplicáveis. Pule a pergunta se você respondeu SIM no item anterior, (machos permanecem por pouco tempo na fazenda).

- ☐ Nenhum
☐ Colostro ou colostro em pó
☐ Leite ou sucedâneo
☐ Água à vontade
☐ Concentrado

No caso de uso de implantes para a IATF em novilhas há a utilização de um implante especial de tamanho menor?

- ☐ Não se aplica
☐ Não tenho a informação
☐ Raramente ou nunca
☐ Às vezes
☐ Frequentemente
☐ Sempre

A marca a ferro (seja quente ou a frio) é utilizada como método de identificação dos animais? (Não considere a marcação obrigatória em relação à vacinação de Brucelose, apenas marque sim se usar a marca a ferro como identificação).

- ☐ Não tenho a informação
☐ Sim
☐ Não

Qual é o sistema de identificação**utilizado?** (Marque quantas opções desejar.)

- ☐ Não tenho a informação
- ☐ Não são identificados
- ☐ Marca a ferro
- ☐ Tatuagem
- ☐ Brinco
- ☐ Bottom simples
- ☐ Bottom com identificação eletrônica
- ☐ Bolus com identificação eletrônica
- ☐ Colar com identificação eletrônica
- ☐ Chip subcutâneo

Se for necessário realizar EUTANÁSIA, o procedimento é (ou seria) realizado prioritariamente por:

- ☐ Não há eutanásia
- ☐ Pessoa sem treinamento específico
- ☐ Pessoa treinada por veterinário(a)
- ☐ Veterinário(a)

Há uso de OCITOCINA como rotina diária para acelerar a descida do leite?

(Considere situações de ordenha rotineira, com exceção da ordenha do colostro.)

- ☐ Sempre
- ☐ Frequentemente
- ☐ Às vezes
- ☐ Raramente ou nunca